



# TÜRKİYE ROMATOLOJİ DERNEĞİ

## Aydınlatılmış Onam Formu

### Allopurinol (Allogut, Alloürük, Ürikoliz 300 mg tablet)

**Kategori:** ilaç - Romatoloji - Antimetabolit

**Tanım:**

Doktorunuz sizinle tedavinizde allopurinol adlı ilacın kullanımının gerekliliği hakkında konuştunuz. Allopurinol bir xanthine-oxidase inhibitörüdür ve anti-gut ilaç olarak kullanılır. Anti-gut ilaçlar gutta ilgili kilo artımı kan ürik asit düzeylerini azaltmak için kullanılırlar. Allopurinol gut hastalığına bağlı ağrıyı tedavi etmek amacıyla kullanılmaz. Ağrı olması durumunda, ağrıyı gidermek için gerekli ilaçların allopurinolle birlikte alınması uygundur.

**Faydaları:**

Gut hastalığında kan ürik asit düzeylerinin azaltılmasında etkili bir ilaçtır.

**Alternatifleri:**

Sizin için uygun olabilecek farklı tedavi yöntemlerini doktorunuza danışarak öğrenebilirsiniz.

**Riskleri:**

- Alerjik reaksiyonlar: Nefes darlığı, boğazda tıkanma hissi, dudaklarda, dilde, yüzde, göğüs bölgesinde kızamık veya kurdeşen (ürtiker) gelişirse doktorunuzla iletişime geçiniz.
- Cilt döküntüsü: allopurinol alımından kaynaklanan cilt döküntüsü hayatı tehdit edebilecek reaksiyonların başlangıcı için bir işaret olabilir. Cilt döküntüsü gelişmesi durumunda derhal doktorunuza ile iletişime geçiniz.
- Ağrı yorgunluk, ateş, titreme, kas ağrısı.
- Baş ağrısı, baş dönmesi, bayılma.
- Allopurinolü ilk aldığınızda, vücudunuzda ürik asit miktarı artacaktır, bu da böbrek taşı veya daha sık gut atakları geçirmenize yol açabilir. Bu nedenle ilacı alırken fazla miktarda su içmeniz bu riski azaltabilir.
- Ağrıdaki durumlara halen sahip iseniz veya geçmişte bu durumlara sahip iseniz bunu doktorunuza bildirmelisiniz: yüksek kan basıncı (hipertansiyon), diyabet (şeker hastalığı), kalp veya böbrek hastalığı.
- Mide ağrısı, bulantı, kusma.
- İlaç etkileşimleri: Allopurinol tedavisine başlamadan önce, ciddi hatta hayatı tehdit edebilecek ilaç etkileşimlerinin olmasını engellemek için doktorunuza halen kullanmakta olduğunuz tüm ilaçlar ve ilaç dışı tedaviler hakkında bilgi veriniz.
- İlacın kullanımına bağlı gelişebilecek çeşitli yan etkilerin erken dönemde tespit edilebilmesi amacıyla, ilacı kullanmaya başladıktan sonra ilk ay, 2 haftada bir, sonraki 3 ay, ayda bir, ve takip eden aylarda, 2 ayda bir defa tam kan sayımı ve Üre, kreatinin, AST, ALT tetkiklerini yaptırarak sonuçlarını doktorunuza bildiriniz.

- Gebelik: Allopurinol, Amerikan Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından ilaçların gebelikte kullanımı ile ilgili hazırlanan risk değerlendirme rehberinde C kategorisinde bir ilaç olarak değerlendirilmiştir. Bunun anlamı, dozmamı bebekte doğumsal anomalilere yol açıp açmadığının bilinmediğidir. Eğer gebesiniz doktorunuz ile konumadan ilacı almaya başlamayınız.
- Emzirme: Allopurinol anne sütüne geçebilir. Eğer anne sütü ile çocuğunuzu besliyorsanız ilacı almadan önce doktorunuzla görüşün.
- Bu istenmeyen etkiler en sık görülenleri olup, beklenmeyen bir durumla karşılaşılırsa takdirde tedaviyi başlatan hekiminize danışmanız gereklidir.

### Sonuçlar

Bu ilacı kullanmak için gerekli onayı vermemem durumunda bu ilaca başlı herhangi bir fayda ve ilaçla ilgili herhangi bir risk ile karşılaşmayacağımı anlıyorum.

### Onamın geri çekilmesi:

İlacı almaya başlamadan önce istediğiniz zaman ilacı kullanmak için vermiş olduğunuz onayı geri çekebilirsiniz. Ancak Allopurinolu kullanmaya başladığınız andan itibaren bu ilaçtan kaynaklanacak tüm fayda ve riskleri kabul etmiş olursunuz. İlacın ani olarak bırakılması ya da dozunun değiştirilmesi ciddi hatta hayatı tehdit edici sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle doktorunuzun onayı olmadan ilacınızın dozunda herhangi bir değişiklik yapmayınız.



**TÜRKİYE ROMATOLOJİ DERNEĞİ**

### Notlar

---

---

---

---

---

Sizin hastalığınız ve tıbbi durumunuzdan kaynaklanan özel ilaçlara bağımlı olarak adı geçen ilacın ek fayda ya da riskleri olabilir. Doktorunuz bu özel durumlar hakkında size bilgi verecektir.

Bana doktorum tarafından kullanmam tavsiye edilen yukarıda adı geçen ilaç ile ilgili tüm fayda ve riskleri okudum. Doktor, hem iye, ve / veya diğer görevli bir personel tarafından ilaç ile ilgili tüm sorularıma cevap verildi. Kendi iradem ile bana tavsiye edilen ilacı kullanmak istiyorum.

<b>Hastanın Adı Soyadı:</b>  <b>Adres:</b>  <b>Tel:</b>	<b>Hastanın İmzası:</b>	<b>Tarih:</b>
<b>Tanık: Hasta yakını veya vasi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 18 yaş altı hastalar için: Anne/Baba/Yakını</li><li>• Okur-yazar olmayan/görme özürlü hastalar için sözlü bilgilendirmeye ihtiyacı olan</li><li>• Yabancı dil nedeniyle çevirmen /tercüman</li></ul>	<b>Anne [ ] Baba [ ] Diğeri [ ]</b> <b>Adı Soyadı:</b> <b>Adres:</b> <b>Tel:</b> <b>İmzası:</b>	<b>Tarih:</b>
<b>Doktorun Adı Soyadı:</b>  <b>Adres:</b>  <b>Tel:</b>	<b>Doktorun İmzası:</b>	<b>Tarih:</b>

**Kaynaklar:**

1. **Ankara Romatoloji Grubu: (Alfabetik sıra ile)** Ankara Ü. İmmünoloji-Romatoloji, Başkent Ü. Romatoloji, GATA Romatoloji, Gazi Ü. Romatoloji, Hacettepe Ü. Romatoloji, SB Ankara Dışkapı İhtisas Hastanesi İmmünoloji-Romatoloji, SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Romatoloji.
2. [www.uptodate.com](http://www.uptodate.com)