



# TÜRKİYE ROMATOLOJİ DERNEĞİ

## Aydınlatılmış Onam Formu

### Azatiyoprin (Imuran, Azathioprine tablet 25 - 50 mg)

**Kategori:** ilaç - Romatoloji - Temel etkili anti-romatizmal ilaçlar - immünosüpresifler

#### **Tanım:**

Doktorunuz sizinle tedavinizde azatiyoprin adlı ilacın kullanımının gerekliliği hakkında konuştunuz. Azatiyoprin temel etkili anti-romatizmal ilaç ve immünosüpresif (bağışıklık sistemini baskılayıcı) bir ilaç olup bağışıklık sisteminizin çeşitli uyarılara karşı verdiği yanıtı düzenleyerek etkisini göstermektedir. Ağız yoluyla kullanılabilir.

#### **Faydaları:**

Dirençli romatoid artrit (RA), sistemik lupus eritematozus (SLE), dermatomyozit/polimyozit (iltihaplı kas hastalıkları), Behçet hastalığı ve uzun süreli kortikosteroid kullanımı gereken otoimmün hastalıkların geniş bir grubunda steroid ihtiyacını azaltıcı ilaç olarak kullanılabilir.

#### **Alternatifleri:**

Sizin için uygun olabilecek farklı tedavi yöntemlerini doktorunuza danışarak öğrenebilirsiniz.

#### **Riskleri:**

- Alerjik reaksiyonlar: Nefes darlığı, boğazda tıkanma hissi, dudaklarda, dilde, yüzde, şişlik veya kurdeşen (ürtiker) gelişirse doktorunuzla iletişime geçiniz.
- İlaç etkileşimleri: Azatiyoprin tedavisine başlamadan önce, ciddi hatta hayatı tehdit edebilecek ilaç etkileşimlerinin olmasını engellemek için doktorunuza halen kullanmakta olduğunuz tüm ilaçlar ve ilaç dışı tedaviler hakkında bilgi veriniz.
- İlacın kullanımına bağlı gelişebilecek çeşitli yan etkilerin erken dönemde tespit edilebilmesi amacıyla, ilacı kullanmaya başladıktan sonra ilk ay, 2 haftada bir, sonraki 3 ay, ayda bir, ve takip eden aylarda, 2 ayda bir defa tam kan sayımı ve Üre, kreatinin, AST, ALT tetkiklerini yaptırarak sonuçlarını doktorunuza bildiriniz.
- Cilt döküntüsü, deride su toplama kabarcıklar, ağız veya dudaklarda aftöz lezyonlar.
- Öksürük veya boğaz ağrısı, ağrı yorgunluk ve güçsüzlük.
- Bacaklarda şişlik.
- Mide ağrısı, bulantı, kusma.
- Ani başlangıçlı ateş.
- İdrar yolu infeksiyonu ile ilgili olabilecek, sırt veya yan ağrısı veya ağrı ya da zorlanarak idrar yapma.
- Azatiyoprin kullanımı lösemi, lenfoma ve cilt kanseri gibi bazı kanser türlerinin hayat boyunca gelişim riskinde artış ile ilişkilidir. Bu durum özellikle azatiyoprinin diğer ilaçlarla birlikte kullanımında daha belirgindir. Örneğin: inflamatuvar barsak hastalıklarının tedavisinde anti – TNF ilaçlarla beraber kullanıldığında.

- A a ıdaki durumlardan herhangi birine sahip olan veya ailesinde bu tür durumlar olan hastalar bunu doktorlarına bildirmelidir:
  - suçiçe i geçirme veya yakın zamanda su çiçe i geçiren birisiyle temas, herpes zoster (zona), gut (damla hastalığı), her tür infeksiyon, böbrek veya karaciğer hastalığı, veya pankreatit. Azatiyoprin kullanımı bu durumlara neden olabilir veya bu durumların kötüleşmesine yol açabilir.
- Azatiyoprin bağışıklık sisteminiz üzerine etki gösterdiğinden aşılanma (immünizasyon) veya başka herhangi bir ilaç almadan önce mutlaka doktorunuzla temasa geçin. Doktorunuz bazı aşıları izin verirken, bazılarını yasaklayabilir. Bu arada çevrenizdekilerinde aşılanmaları konusunda dikkatli olmanız gerekir, örneğin çevrenizde aşıdan polio (çocuk felci) aşı almamış birinin olması sizin için tehlikeli olabilir.
- Gebelik: Azatiyoprin, Amerikan Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından ilaçların gebelikte kullanımı ile ilgili hazırlanan risk değerlendirme rehberinde C kategorisinde bir ilaç olarak değerlendirilmiştir. Bunun anlamı, dozmamı bebekte doğumsal anomalilere yol açabileceğidir. Anne veya babadan herhangi biri azatiyoprin alıyorsa gebelikten kaçınılmalıdır. Eğer gebe iseniz doktorunuz ile konumadan ilacı almaya başlamayınız.
- Emzirme: Azatiyoprin emzirilen bebeğe zarar verebilir. Eğer anne sütü ile çocuğunuzu besliyorsanız ilacı almadan önce doktorunuzla görüşün.
- Bu istenmeyen etkiler en sık görülenleri olup, beklenmeyen bir durumla karşılaşılırsa takdirde tedaviyi başlatan hekiminize danışmanız gereklidir.

#### Sonuçlar

- Bu ilacı kullanmak için gerekli onayı vermemem durumunda bu ilaca başlı herhangi bir fayda ve ilaçla ilgili herhangi bir risk ile karşılaşmayacağımı anlıyorum.

#### Onamın geri çekilmesi:

İlacı almaya başlamadan önce istediğiniz zaman ilacı kullanmak için vermiş olduğunuz onayı geri çekebilirsiniz. Ancak azatiyoprin'i kullanmaya başladığınız andan itibaren bu ilaçtan kaynaklanacak tüm fayda ve riskleri kabul etmiş olursunuz. İlacın ani olarak bırakılması ya da dozunun değiştirilmesi ciddi hatta hayatı tehdit edici sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle doktorunuzun onayı olmadan ilacınızın dozunda herhangi bir değişiklik yapmayınız.



**TÜRKİYE ROMATOLOJİ DERNEĞİ**

#### Notlar

---

---

---

Sizin hastalığınız ve tıbbi durumunuzdan kaynaklanan özel şartlara bağlı olarak adı geçen ilacın ek fayda ya da riskleri olabilir. Doktorunuz bu özel durumlar hakkında size bilgi verecektir.

Bana doktorum tarafından kullanmam tavsiye edilen yukarıda adı geçen ilaç ile ilgili tüm fayda ve riskleri okudum. Doktor, hem bire ve / veya diğer görevli bir personel tarafından ilaç ile ilgili tüm sorularıma cevap verildi. Kendi iradem ile bana tavsiye edilen ilacı kullanmak istiyorum.

<b>Hastanın Adı Soyadı:</b>  <b>Adres:</b>  <b>Tel:</b>	<b>Hastanın imzası:</b>	<b>Tarih:</b>
<b>Tanık: Hasta yakını veya vasi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 18 yaş altı hastalar için: Anne/Baba/Yakını</li><li>• Okur-yazar olmayan/görme özürlü hastalar için sözlü bilgilendirmeye elverişli</li><li>• Yabancı dil nedeniyle çevirmen /tercüman</li></ul>	<b>Anne [ ] Baba [ ] Diğer [ ]</b> <b>Adı Soyadı:</b> <b>Adres:</b> <b>Tel:</b> <b>imzası:</b>	<b>Tarih:</b>
<b>Doktorun Adı Soyadı:</b>  <b>Adres:</b>  <b>Tel:</b>	<b>Doktorun imzası:</b>	<b>Tarih:</b>

**Kaynaklar:**

1. **Ankara Romatoloji Grubu: (Alfabetik sıra ile)** Ankara Ü. İmmünoloji-Romatoloji, Bakırköy Ü. Romatoloji, GATA Romatoloji, Gazi Ü. Romatoloji, Hacettepe Ü. Romatoloji, SB Ankara Dışkapı Nispetiye Hastanesi İmmünoloji-Romatoloji, SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Romatoloji.
2. [www.uptodate.com](http://www.uptodate.com)