



TÜRKİYE ROMATOLOJİ DERNEĞİ

Aydınlatılmış Onam Formu

Heparin - Düşük moleküllü ağırlıklı heparin

Kategori: İlaç - Kardiyovasküler- Antikoagülan

Tanım:

Doktorunuz sizinle tedavinizde heparin adlı ilacın kullanımının gerekliliği hakkında konuştunuz. Heparin, kanın pıhtılaşmasını önleyen ve kanın akmasını hızlandıran bir ilaçtır. Enjeksiyon yolu ile uygulanır.

Faydaları:

Heparin, kateter taşıyan hastalar, yapay kalp kapaklı hastalar, pıhtılaşmaya eğilimli olan hastalar, kalp ritmi problemi olan hastalar, antifosfolipid sendromu ve diğer birçok hastalıkta kullanılan bir ilaçtır.

Alternatifleri:

Sizin için uygun olabilecek farklı tedavi yöntemlerini doktorunuza danışarak öğrenebilirsiniz.

Riskleri:

- Heparin kanı incelttiği için, morarma veya kanama (iç organ kanaması dahil) riskini artırır. Bu tür problemler ya da arsanız doktorunuzla iletişime geçiniz.
- Alerjik reaksiyonlar: Nefes darlığı, boğazda tıkanma hissi, dudaklarda, dilde, yüzde, şişlik veya kurdeşen gelişirse doktorunuza bildirin.
- Diğer bakteriyel endokardit, hipertansiyon, hemofili, veya diğer kan hastalıkları, mide ülseri, veya karaciğer hastalığı varsa, veya cerrahi işlem planlanıyorsa, doktorunuza bu durum hakkında uyarmanız gereklidir.
- Kanama riskini artırdıklarından dolayı, Heparin alırken aspirin, ibuprofen, veya diğer non-steroidal anti-inflamatuar ilaç almamalıdır.
- Büyük abdest renginin değişmesi, idrar veya büyük abdestte kan görülmesi.
- Böbrek yetmezliği, yüksek tansiyon probleminiz varsa bu durumlarda bu ilaçların kullanımı çeşitli problemlere yol açabilir.
- Derinizde toplu olarak küçük kırmızı noktalar, alımlı kanamalar veya morarmalar gelişebilir. Heparin hem iç hem de dış kanama eğiliminizi artırabilir. Bu nedenle kanamayı kolaylaştıran temas sporları, tıraş olma, dişlerinizi fırçalamaya ve diğer aktiviteler sırasında dikkatli olmanız gerekir.
- İlaç etkileşimleri: Heparin tedavisine başlamadan önce, ciddi hatta hayatı tehdit edebilecek ilaç etkileşimlerinin olmasını engellemek için doktorunuza halen kullanmakta olduğunuz tüm ilaçlar ve ilaç dışı tedaviler hakkında bilgi veriniz.
- Gebelik: Heparin, Amerikan Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından ilaçların gebelikte kullanımı ile ilgili hazırlanan risk değerlendirme rehberinde C kategorisinde bir ilaç olarak değerlendirilmiştir. Bunun anlamı, doğum öncesi dönemde kullanılması gebelikte doğum komplikasyonlarına yol açmayacağına inanılmaktadır. Eğer gebesiniz doktorunuzla konuşmadan önce kullanılmamalıdır.

almaya başlamayınız. Gebelik boyunca sürekli düşük moleküler ağırlıklı heparin kullanmanız gerekiyorsa kemik erimesi (osteoporoz) karşı düzenli kalsiyum ve D vitamini (profilaksisi) almanız önerilir.

- Emzirme: Heparin anne sütüne geçmez. Buna rağmen eme er anne sütü ile çocuğunuzu besliyorsanız ilacı almadan önce doktorunuzla görüşün.
- Bu istenmeyen etkiler en sık görülenleri olup, beklenmeyen bir durumla karşılaşılırsa takdirde tedaviyi başlatan hekiminize danışmanız gereklidir.

Sonuçlar

- Bu ilacı kullanmak için gerekli onayı vermemem durumunda bu ilaca başlı herhangi bir fayda ve ilaçla ilgili herhangi bir risk ile karşılaşmayacağımı anlıyorum.

Onamın geri çekilmesi:

İlacı almaya başlamadan önce istediğiniz zaman ilacı kullanmak için vermiş olduğunuz onayı geri çekebilirsiniz. Ancak heparin'i kullanmaya başladığınız andan itibaren bu ilaçtan kaynaklanacak tüm fayda ve riskleri kabul etmiş olursunuz. İlacın ani olarak bırakılması ya da dozunun değiştirilmesi ciddi hatta hayatı tehdit edici sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle doktorunuzun onayı olmadan ilacınızın dozunda herhangi bir değişiklik yapmayınız.



TÜRK YE ROMATOLOJ DERNE

Sizin hastalığınız ve tıbbi durumunuzdan kaynaklanan özel risklere bağlı olarak adı geçen ilacın ek fayda ya da riskleri olabilir. Doktorunuz bu özel durumlar hakkında size bilgi verecektir.

Bana doktorum tarafından kullanmam tavsiye edilen yukarıda adı geçen ilaç ile ilgili tüm fayda ve riskleri okudum. Doktor, hemşire, ve / veya diğer görevli bir personel tarafından ilaç ile ilgili tüm sorularıma cevap verildi. Kendi iradem ile bana tavsiye edilen ilacı kullanmak istiyorum.

Hastanın Adı Soyadı: Adres: Tel:	Hastanın imzası:	Tarih:
Tanık: Hasta yakını veya vasi <ul style="list-style-type: none">• 18 yaş altı hastalar için: Anne/Baba/Yakını• Okur-yazar olmayan/görme özürlü hastalar için sözlü bilgilendirmeye ahitlik eden• Yabancı dil nedeniyle çevirmen /tercüman	Anne [] Baba [] Di er [] Adı Soyadı: Adres: Tel: imzası:	Tarih:
Doktorun Adı Soyadı: Adres: Tel:	Doktorun imzası:	Tarih:

Kaynaklar:

1. **Ankara Romatoloji Grubu: (Alfabetik sıra ile)** Ankara Ü. İmmünoloji-Romatoloji, Bakırköy Ü. Romatoloji, GATA Romatoloji, Gazi Ü. Romatoloji, Hacettepe Ü. Romatoloji, SB Ankara Dış Kapı Hastanesi İmmünoloji-Romatoloji, SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Romatoloji.
2. www.uptodate.com