



## TÜRK YE ROMATOLOJ DERNE

### Aydınlatılmı Onam Formu

#### **Metotreksat (Emthexate, Trexan)**

---

**Kategori:** İlaç - Romatoloji - Temel etkili ilaçlar

**Tanım:**

Doktorunuz sizinle tedavinizde metotreksat adlı ilacın kullanımının gereklili i hakkında konu tu. Metotreksat ba ı klık sisteminizin çe itli uyarılara kar ı verdi i yanıtı düzenleyerek etkisini gösteren bir ilaçtır. Bu ilaç kanser hastalarında kullanıldı ı gibi ba ı klık sisteminin çok aktif oldu u, psöriazis (sedef hastalı ı) ve romatoid artrit gibi hastalıklarda ve di er gerekli durumlarda da kullanılmaktadır. A ız yoluyla veya enjeksiyon ekinde kullanılabilir. Haftada bir veya iki kez gerekiyorsa daha sık alınabilir.

**Faydaları:**

Çe itli romatolojik hastalıklarda etkili oldu u klinik çalı malar ile kanıtlanmı bir ilaçtır.

**Alternatifleri:**

Sizin için uygun olabilecek farklı tedavi yöntemlerini doktorunuza danı arak ö renebilirsiniz.

**Riskleri:**

- Metotreksat alırken alkol, aspirin ve di er mideye dokunabilecek ilaçlardan kaçının.
- Alerjik reaksiyonlar: nefes darlı ı, bo azda tıkanma hissi, dudaklarda, dilde, yüzde, i lik veya kurde en (ürtiker) geli irse doktorunuzla irtibata geçiniz.
- Güne duyarlılı ı, deri döküntüsü veya deri rengi de i ikli i.
- Ba a rısı, bulanık görme.
- Saç dökülmesi olu abilir.
- Mide a rısı, bulantı, kusma.
- Anemi (kansızlık), halsizlik, yorgunluk.
- Trombosit (kan pıhtıla ma hücreleri) sayısında azalma ve kanama riskinde artı .
- Lökosit (beyaz küre) sayısında azalma ve enfeksiyon riskinde artı .
- E er kuru, balgamsız öksürük, nefes darlı ı, siyah renkli gayta veya idrar renginde koyula ma geli irse hemen doktorunuzla irtibata geçiniz.
- Karaci er hasarı.
- İlaç etkile imleri: Metotreksat tedavisine ba lamadan önce, ciddi hatta hayatı tehdit edebilecek ilaç etkile imlerinin olmasını engellemek için doktorunuza halen kullanmakta oldu unuz tüm ilaçlar ve ilaç dı ı tedaviler hakkında bilgi veriniz.

- İlacın kullanımına başlamadan önce yapılacak kan testleri olan kreatinin, AST, ALT testlerinin yapılması amacıyla, ilacı kullanmaya başladıktan sonra ilk ay, 2 haftada bir, sonraki 3 ay, ayda bir, ve takip eden aylarda, 2 ayda bir defa tam kan sayımı ve Üre, kreatinin, AST, ALT tetkiklerini yaptırarak sonuçlarını doktorunuza bildiriniz.
- Gebelik: Metotreksat, Amerikan Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından ilaçların gebelikte kullanımı ile ilgili hazırlanan risk değerlendirme rehberinde X kategorisinde bir ilaç olarak değerlendirilmiştir. Bunun anlamı, doğum yapan kadınlarda gebelikte kullanımı ile ilgili bazı anomaliye yol açabileceğidir. Anne veya babadan herhangi biri metotreksat alıyorsa gebelikten kaçınılmalıdır. Gebelik planlanıyorsa en az 3 – 6 ay öncesi ilaç kesilmelidir. Eğer gebelikte kullanıyorsanız doktorunuz ile konu hakkında konuşmanız gerekmektedir.
- Emzirme: Metotreksat emzirilen bebeğe zarar verebilir. Eğer anne sütü ile çocuğunuzu besliyorsanız ilacı almadan önce doktorunuzla görüşünüz.
- Bu istenmeyen etkiler en sık görülenleri olup, beklenmeyen bir durumla karşılaşılırsa tedaviyi başlatan hekiminize danışmanız gereklidir.

### Sonuçlar

- Bu ilacı kullanmak için gerekli onayı vermemem durumunda bu ilaca başlamadan herhangi bir fayda ve ilaçla ilgili herhangi bir risk ile karşılaşmayacağımı anlıyorum.

### Onamın geri çekilmesi:

İlacı almaya başlamadan önce istediğiniz zaman ilacı kullanmak için verdiğiniz onayı geri çekebilirsiniz. Ancak Metotreksat'ı kullanmaya başladıktan itibaren bu ilaçtan kaynaklanacak tüm fayda ve riskleri kabul etmiş olursunuz. İlacın aniden bırakılması ya da dozunun değiştirilmesi ciddi hatta hayatı tehdit edici sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle doktorunuzun onayı olmadan ilacınızın dozunda herhangi bir değişiklik yapmayınız.



**TÜRK YE ROMATOLOJ DERNE**

### Notlar

---

---

---

---

---

Sizin hastalığınız ve tıbbi durumunuzdan kaynaklanan özel risklere başlamadan önce ilacın ek fayda ya da riskleri olabilir. Doktorunuz bu özel durumlar hakkında size bilgi verecektir.

Bana doktorum tarafından kullanmam tavsiye edilen yukarıda adı geçen ilaç ile ilgili tüm fayda ve riskleri okudum. Doktor, hem iire, ve / veya di er görevli bir personel tarafından ilaç ile ilgili tüm sorularıma cevap verildi. Kendi iradem ile bana tavsiye edilen ilacı kullanmak istiyorum.

<b>Hastanın Adı Soyadı:</b>  <b>Adres:</b>  <b>Tel:</b>	<b>Hastanın mzası:</b>	<b>Tarih:</b>
<b>Tanık: Hasta yakını veya vasi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 18 ya altı hastalar için: Anne/Baba/Yakını</li><li>• Okur-yazar olmayan/görme özürlü hastalar için sözlü bilgilendirmeye ahitlik eden</li><li>• Yabancı dil nedeniyle çevirmen /tercüman</li></ul>	<b>Anne [ ] Baba [ ] Di er [ ]</b>  <b>Adı Soyadı:</b>  <b>Adres:</b>  <b>Tel:</b>  <b>mzası:</b>	<b>Tarih:</b>
<b>Doktorun Adı Soyadı:</b>  <b>Adres:</b>  <b>Tel:</b>	<b>Doktorun mzası:</b>	<b>Tarih:</b>

**Kaynaklar:**

1. **Ankara Romatoloji Grubu: (Alfabetiksıra ile)** Ankara Ü. mmünoloji-Romatoloji, Ba kent Ü. Romatoloji, GATA Romatoloji, Gazi Ü. Romatoloji, Hacettepe Ü. Romatoloji, SB Ankara Dı kapı htisas Hastanesi mmünoloji-Romatoloji, SB Ankara Numune E itim ve Ara tırma Hastanesi Romatoloji.
2. [www.uptodate.com](http://www.uptodate.com)