



TÜRKİYE ROMATOLOJİ DERNEĞİ

Aydınlatılmış Onam Formu

Sulfasalazin (Salazopyrin)

Kategori: ilaç - Romatoloji - Temel etkili ilaçlar

Tanım

Doktorunuz sizinle tedavinizde salazopyrin adlı ilacın kullanımının gerekliliği hakkında konuştunuz. Salazopyrin bağışıklık sisteminizin çeşitli uyarılara karşı verdiği yanıtı düzenleyerek etkisini gösteren bir ilaçtır. Bu ilaç bağışıklık sisteminin çalışmasındaki bozukluklardan kaynaklanan, romatoid artrit, spondilartroz (özellikle ankilozan spondilit başta olmak üzere bu gruptaki diğer hastalıklarda) gibi hastalıklarda kullanılan bir ilaçtır. Doktorunuzun önerisine bağlı olarak kullanılmakla beraber genellikle günde 2 defa alınan bir ilaçtır. Salazopyrin etkisi geç başlangıçlı bir ilaç olup, tedaviden fayda görebilmeniz için 4-8 hafta süre ile ilacı kullanmanız gerekmektedir.

Faydaları

Çeşitli romatolojik hastalıklarda etkili olduğu klinik çalışmalar ile kanıtlanmış bir ilaçtır.

Alternatifler

Sizin için uygun olabilecek farklı tedavi yöntemlerini doktorunuza danışarak öğrenebilirsiniz.

Riskler

- Salazopyrinin kullanımı, sulfonamid ya da aspirin ve türevi ilaçlara karşı allerjisi ya da ağırlı duyarlılık reaksiyonu hikayesi olan kişilerde sakıncalıdır. Bu nedenle adı geçen ilaçlara karşı daha önce reaksiyon geliştirdi iseniz doktorunuza bu konuda uyarınız.
- Allerjik reaksiyonlar: solunum sıkıntısı, dilde ve yüzde şişme veya ürtiker gibi etkileriniz olması durumunda acil olarak doktorunuz ile iletişime geçiniz.
- G6PD (Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz) enzim eksikliği mevcut ise, salazopyrin kullanımı hemolitik anemiye (alyuvarların yıkımına bağlı kansızlık) yol açabilir.
- ilaç etkileşimleri: Salazopyrin tedavisine başlamadan önce, ciddi hatta hayatı tehdit edebilecek ilaç etkileşimlerinin olmasını engellemek için doktorunuza halen kullanmakta olduğunuz tüm ilaçlar ve ilaç dışı tedaviler hakkında bilgi veriniz.
- Ciltte döküntü, kaşıntı, saç dökülmesi
- Baş ağrısı, sersemlik hissi.
- Mide ağrısı, bulantı, kusma.
- Anemi (kansızlık), halsizlik, çabuk yorulma.
- Trombosit (kan pıhtılaşma hücreleri) sayısında azalma ve buna bağlı kanama riski.
- Lökosit (Akyuvar) sayısında azalma ve buna bağlı infeksiyon riskinde artış.
- Karaciğer hasarı, karaciğer enzim yüksekliği

- Vücut sıvılarında idrar vb renk de i ikli i turuncu, sarı renk gibi neden olabilir.
- İlacın kullanımına ba lı geli ebilecek çe itli yan etkilerin erken dönemde tespit edilebilmesi amacıyla,ilacı kullanmaya ba ladıktan sonra ilk ay, 2 haftada bir, sonraki 3 ay, ayda bir, ve takip eden aylarda, 2 ayda bir defa tam kan sayımı ve Üre, kreatinin, AST, ALT tetkiklerini yaptırarak sonuçlarını doktorunuza bildiriniz.
- Gebelik: Salazopyrin, Amerikan Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından ilaçların gebelikte kullanımı ile ilgili hazırlanan risk de erlendirme rehberinde B kategorisinde bir ilaç olarak de erlendirilmi tir. Bunun anlamı ilacın gebelikte kullanımıyla ilgili yapılan hayvan çalı malarında bir sorunla kar ıla ılmadı ı, ancak insanlar üzerinde gebelikte kullanımı ile ilgili kontrollü çalı ma bulunmadı ı eklindedir. E er gebe iseniz doktorunuz ile konu madan ilacı almaya ba lamayınız. Ancak ilacın potansiyel faydası olası riskinden fazla ise gebelikte yakın takiple kullanılabilir.
- Emzirme: Emzirme döneminde salazopyrin kullanımının bebek üzerine olumsuz bir etkisi bildirilmemi tir.
- Erkek hastalarda sperm sayısında, ilaç alındı ı sürece görülen ve ilacın bırakılmasıyla normale dönen azalma görülebilir.
- Bu istenmeyen etkiler en sık görülenleri olup, beklenmeyen bir durumla kar ıla ıldı ı takdirde tedaviyi ba layan hekiminize danı manız gereklidir.

Sonuçlar

- Bu ilacı kullanmak için gerekli onayı vermemem durumunda bu ilaca ba lı herhangi bir fayda ve ilaçla ilgili herhangi bir risk ile kar ıla mayaca ımı anlıyorum.



TÜRK YE ROMATOLOJ DERNE

Onamın geri çekilmesi

İlacı almaya ba lamadan önce istedi iniz zaman ilacı kullanmak için vermi oldu unuz onayı geri çekebilirsiniz. Ancak salazopyrini kullanmaya ba ladı ınız andan itibaren bu ilaçtan kaynaklanacak tüm fayda ve riskleri kabul etmi olursunuz. İlacın ani olarak bırakılması ya da dozunun de i tirilmesi ciddi hatta hayatı tehdit edici sonuçlar do urabilir. Bu nedenle doktorunuzun onayı olmadan ilacınızın dozunda herhangi bir de i iklik yapmayınız.

Notlar

Sizin hastalığınız ve tıbbi durumunuzdan kaynaklanan özel ilaçlara bağımlı olarak adı geçen ilacın ek fayda ya da riskleri olabilir. Doktorunuz bu özel durumlar hakkında size bilgi verecektir.

Bana doktorum tarafından kullanmam tavsiye edilen yukarıda adı geçen ilaç ile ilgili tüm fayda ve riskleri okudum. Doktor, hem bire, ve / veya diğer görevli bir personel tarafından ilaç ile ilgili tüm sorularıma cevap verildi. Kendi iradem ile bana tavsiye edilen ilacı kullanmak istiyorum.

Hastanın Adı Soyadı: Adres: Tel:	Hastanın imzası:	Tarih:
Tanık: Hasta yakını veya vasi <ul style="list-style-type: none">• 18 yaş altı hastalar için: Anne/Baba/Yakını• Okur-yazar olmayan/görme özürlü hastalar için sözlü bilgilendirmeye ahitlik eden• Yabancı dil nedeniyle çevirmen /tercüman	Anne [] Baba [] Di er [] Adı Soyadı: Adres: Tel: imzası:	Tarih:
Doktorun Adı Soyadı: Adres: Tel:	Doktorun imzası:	Tarih:

Kaynaklar:

1. Ankara Romatoloji Grubu: (Alfabetiksıra ile) Ankara Ü. İmmünoloji-Romatoloji, Ba kent Ü. Romatoloji, GATA Romatoloji, Gazi Ü. Romatoloji, Hacettepe Ü. Romatoloji, SB Ankara Dı kapı İhtisas Hastanesi İmmünoloji-Romatoloji, SB Ankara Numune E itim ve Ara tırma Hastanesi Romatoloji.
2. www.uptodate.com